

PROSPAN®



Öksürük damlası

Kullanma talimatı: Kullanıcı için bilgiler

Prospan® öksürük damlası

Oral sıvı

Etkin madde: Kurutulmuş hedera helix folium ekstresi

Bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilaç reçetesiz temin edilebilir. En iyi tedavi sonucunu elde etmek için Prospan® öksürük damlası doğru şekilde uygulanmalıdır.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Daha fazla bilgi veya tavsiyeye gereksinim duymanız halinde eczacınıza başvurunuz.
- Belirtilerinizin kötüleşmesi veya 7 gün sonra bir iyileşme görülmemesi halinde mutlaka bir doktora başvurmalsınız.
- Belirtilen yan etkilerden birinin sizi önemli derecede etkilemesi veya bu broşürde belirtilmeyen bir yan etki fark etmeniz durumunda lütfen en kısa sürede doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Kullanma talimatının içeriği:

1. Prospan® öksürük damlası nedir ve ne için kullanılır?
2. Prospan® öksürük damlasını kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?
3. Prospan® öksürük damlası nasıl alınır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Prospan® öksürük damlası nasıl saklanır?
6. Diğer bilgiler

1. Prospan® öksürük damlası nedir ve ne için kullanılır?

Prospan® öksürük damlası solunum yollarının kataral hastalıkları için bitkisel bir ilaçtır.

Prospan® öksürük damlası öksürüğün eşlik ettiği akut solunum yolu enflamasyonu ve kronik enflamatuvar bronşiyal hastalıkların semptomatik tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

Not:

Şikayetlerin devam etmesi ya da nefes darlığı, ateş, cerahatlı ya da kanlı balgam görülmesi durumunda derhal bir doktora danışılmalıdır.

2. Prospan® öksürük damlasını kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Prospan® öksürük damlası aşağıdaki durumlarda alınmaz

- Etkin maddeye veya ilacın diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
- Minimum alkol miktarlarının alınması (ör. bir bağımlılık tedavisi sonrasında) hekim tarafından yasaklanmışsa.

1 yaş altındaki çocuklar Prospan® öksürük damlasını kullanmamalıdır.

Prospan® öksürük damlası aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır:

Prospan® öksürük damlasının diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Şimdiye kadar hiçbir etkileşim bilinmemektedir. Reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da kısa bir süre önce kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Gebelik ve emzirme dönemi:

Yeterli incelemeler yapılmadığı için bu ilaç gebelikte ve emzirme döneminde sadece hekim ile görüşüldükten sonra kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler:
Özel önlemler gerekli değildir.

Prospan® öksürük damlasının içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Bu ilaç hacimce %47 alkol içerir!

3. Prospan® öksürük damlası nasıl alınır?

Prospan® öksürük damlasını her zaman bu kullanma talimatına göre alınız. Tam emin olmadığınızda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Doktor tarafından aksi belirtilmediği müddetçe normal doz:

Yaş	Tek doz	Günlük toplam doz
Yetişkinler ve 10 yaş ve üstü çocuklar	24 damla 16,8 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresine eşittir	72 damla (3 x 24 damla) 50,4 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresine eşittir
Çocuklar (4-10 yaş)	16 damla 11,2 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresine eşittir	48 damla (3 x 16 damla) 33,6 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresine eşittir
Çocuklar (1-4 yaş)	12 damla 8,4 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresine eşittir	36 damla (3 x 12 damla) 25,2 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresine eşittir

Uygulama şekli:

Sabah, öğle ve akşam öğünlerden önce alınız.

Uygulama süresi:

Tedavinin süresi klinik tablonun tipine ve şiddetine göre değişir; daha hafif solunum yolları enflamasyonlarında en az 1 hafta sürdürülmelidir.

Sürdürülebilir bir tedavi başarısı için belirtiler azalmasından sonra bile ilacın 2-3 gün daha devam etmesi önerilir.

Prospan® öksürük damlasının etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna kanaat getirirseniz doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz.

Kullanmanızı gerekenden daha fazla Prospan® öksürük damlası kullandıysanız:

Prospan® öksürük damlası günlük olarak dozaj talimatında belirtilen veya doktor tarafından reçete edilenden daha fazla alınmamalıdır. Aşırı miktarda (günlük dozun üç katından fazla) alındığında mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir. Bu durumda doktorunuza danışmalısınız.

Prospan® öksürük damlasını kullanmayı unuttursanız:

Bir sonraki seferde çift doz almayınız, doktor tarafından reçete edildiği veya kullanma talimatında tarif edildiği şekilde kullanmaya devam ediniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Prospan® öksürük damlasının içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkilerin değerlendirilmesinde şu yaygınlık bilgileri temel alınmaktadır:

Çok yaygın: 10 kişiden 1'ini etkileyebilen
Yaygın: 100 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Yaygın olmayan: 1.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Seyrek: 10.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Çok seyrek: 10.000 kişiden 1'inden azını etkileyebilen
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Olası yan etkiler:

Sarmaşık içeren ilaçlar alındıktan sonra nadiren nefes darlığı, şişme, cilt kızarıklıkları, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Hassas kişilerde çok seyrek mide bulantısı, kusma, ishal gibi mide bağırsak şikayetleri görülebilir.

Yan etkilerin bildirilmesi

Herhangi bir yan etki fark ederseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu husus, bu prospektüste belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir.

Yan etkileri doğrudan Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn adresinde bulunan Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal ilaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü), Pharmakovigilanz (farmakovijilans) bölümüne de bildirebilirsiniz, web sitesi: www.bfarm.de.

Yan etkileri bildirerek bu ilacın güvenliğiyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesine katkı sağlamış olursunuz.

5. Prospan® öksürük damlası nasıl saklanır?

İlacı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız!

İlacı kutusu ve kabının (etiket) üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmamalısınız! Son kullanma tarihi ayın son gününe denk gelirse.

Açıldıktan veya hazırlandıktan sonra kullanım ömrü:

6 ay

6. Diğer bilgiler

Prospan® öksürük damlası neler içerir?

Etkin maddesi: Kurutulmuş hedera helix folium ekstresi

100 ml sıvı 2 g kurutulmuş hedera helix folium ekstresi içerir (5 - 7,5 : 1). Özütleyici: Etanol %30 (m/m). 1 ml sıvı 29 damlaya eşittir.

Yardımcı maddeler şunlardır:

Sakkarin sodyum, anason yağı, acı rezene yağı, nane yağı, etanol %96, artırılmış su.

Prospan® öksürük damlasının görünümü ve paket içeriği:

Prospan® öksürük damlası orijinal ambalajlarında 20 ml (N 1), 50 ml (N 2) ve 100 ml (N 3) sıvı olarak temin edilebilir.

Muhtemelen tüm ambalaj büyüklükleri dolaşıma sokulmamaktadır.

Ruhsat sahibi ve üretici

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3
61138 Niederdorfelden
Tel.: 06101 / 539 - 300
Faks: +49 6101 / 539 - 315
İnternet: <http://www.engelhard-am.de>
E-posta: info@engelhard-am.de

Bu kullanma talimatı Temmuz 2021 tarihinde onaylanmıştır.

Notlar:

Prospan® öksürük damlası bitkisel etkin madde içerir. Bu bitki özü nedeniyle sıvının içinde koyu asılı parçacıklar oluşabilir; ayrıca tat biraz değişebilir. Ancak bunun ürün kalitesi üzerinde etkisi yoktur.



ENGELHARD