



Листок-вкладыш: Информация для пациента

Проспан® шипучие таблетки от кашля (Prospan® Husten-Brausetabletten)

Действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща
Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, поскольку здесь содержится важная для Вас информация.

Это лекарственное средство можно приобрести без рецепта. Но для того чтобы добиться наилучшего результата лечения, Проспан® шипучие таблетки от кашля следует применять в соответствии с указаниями.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Может быть, Вы захотите позже перечитать его еще раз.
- Если Вам нужна дополнительная информация или совет, обратитесь с вопросом к своему провизору.
- Если Ваши симптомы усугубятся, или же через 7 дней у Вас не наступит улучшение, то Вам нужно обязательно обратиться к своему врачу.
- Если у Вас возникнет одно из перечисленных здесь побочных действий, которое будет очень отрицательно сказываться на Вашем самочувствии, или если Вы заметите у себя такие побочные действия, которые не указаны в этом листке-вкладыше, сообщите, пожалуйста, об этом своему врачу или провизору.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что представляют собой Проспан® шипучие таблетки от кашля, и для чего их применяют?
2. Что Вам нужно учесть перед приемом Проспан® шипучих таблеток от кашля?
3. Как принимать Проспан® шипучие таблетки от кашля?
4. Каковы возможные побочные действия?
5. Как хранить Проспан® шипучие таблетки от кашля?
6. Дополнительная информация

1. Что представляют собой Проспан® шипучие таблетки от кашля, и для чего их применяют?

Проспан® шипучие таблетки от кашля – это растительное лекарственное средство, применяемое при катаральных заболеваниях дыхательных путей.

Проспан® шипучие таблетки от кашля применяют при продуктивном кашле в качестве средства, растворяющего мокроты.

Указание:

Если жалобы сохраняются на протяжении длительного периода времени, либо при возникновении удушья, лихорадки, а также гнойной или содержащей сгустки крови мокроты следует немедленно обратиться к врачу.

2. Что Вам нужно учесть перед приемом Проспан® шипучих таблеток от кашля?

Прием Проспан® шипучих таблеток от кашля запрещен, если Вы сверхчувствительны (аллергичны) к одному из фармацевтически активных ингредиентов или к одной из прочих компонент данного лекарственного препарата, В случае непереносимости фруктозы лечение этими

таблетками можно проводить только после предварительной консультации с врачом.

Особенная осторожность при приеме Проспан® шипучих таблеток от кашля требуется в следующих случаях:

Дети:

Проспан® шипучие таблетки от кашля не пригодны для применения у детей в возрасте младше 6 лет.

При приеме Проспан® шипучих таблеток от кашля вместе с другими лекарственными средствами:

Исследования на эту тему не проводились. До сих пор никакой информации о взаимодействии лекарственных средств не поступало.

Проинформируйте, пожалуйста, своего врача или провизора, если Вы принимаете / применяете или же недавно принимали / применяли другие лекарственные средства, это нужно сделать даже и в том случае, если эти лекарственные средства отпускаются без рецепта.

Беременность и период лактации:

Не применяйте это лекарственное средство во время беременности и в период лактации, поскольку у нас нет достаточно обоснованных исследований.

Способность управлять транспортными средствами и обслуживание машин:

Необходимости в особых мерах предосторожности нет.

Важная информация об определенных прочих компонентах Проспан® шипучих таблеток от кашля:

Одна шипучая таблетка содержит 6,58 ммоль (или 151,33 мг) натрия. Если Вам нужно соблюдать диету с ограничением поваренной соли, то Вам нужно учесть это обстоятельство. В ароматизаторе содержится лактоза. 1 шипучая таблетка содержит 29,7 мг лактозы.

Поэтому, если Вам известно, что Вы страдаете непереносимостью какого-то вида сахара, то перед началом приема Проспан® шипучих таблеток от кашля Вам нужно обязательно проконсультироваться со своим врачом.

3. Как принимать Проспан® шипучие таблетки от кашля?

Всегда принимайте Проспан® шипучие таблетки от кашля в точном соответствии с указаниями, приведенными в этом листке-вкладыше. Если у Вас еще остались сомнения, обратитесь, пожалуйста, с вопросами к своему врачу или к провизору. Если врач не сделал иное назначение, то обычная доза такова:

Возраст	Отдельная доза	Суточная доза
Взрослые и подростки в возрасте, старше 12 лет	По утрам: 1 шипучая таблетка соотв. 65 мг сухого экстракта листьев плюща По вечерам: ½ шипучей таблетки соотв. 32,5 мг сухого экстракта листьев плюща	1 раз по 1 и 1 раз по ½ шипучей таблетки соотв. 97,5 мг сухого экстракта листьев плюща
Дети в возрасте 6–12 лет	½ шипучей таблетки соотв. 32,5 мг сухого экстракта листьев плюща	2 раза по ½ шипучей таблетки соотв. 65 мг сухого экстракта листьев плюща

Способ применения

Шипучие таблетки для внутреннего приема после растворения в воде.

Эти шипучие таблетки можно делить на части.

Шипучие таблетки принимают утром и вечером,

предварительно растворив их в стакане воды (ок. 100-200 мл). Для растворения таблеток можно использовать как горячую, так и холодную воду.

Продолжительность применения

Продолжительность лечения ориентируется на вид и степень тяжести картины заболевания; как правило, продолжительность приема должна составлять 1 неделю. Но если жалобы сохраняются дольше 1 недели, то нужно проконсультироваться с врачом.

Обратитесь, пожалуйста, к своему врачу или к провизору, если у Вас сложится такое впечатление, что действие Проспан® шипучих таблеток от кашля слишком сильное или слишком слабое.

Если принятая Вами доза Проспан® шипучих таблеток от кашля превышает предписанную Вам дозу:

Объем принятых в течение суток Проспан® шипучих таблеток от кашля не должен превышать объем, указанный в руководстве по дозировке, или же назначенный врачом. Прием этого препарата в существенно больших объемах (превышающих тройную суточную дозу) может вызвать тошноту, рвоту и понос. В таком случае Вам следовало бы проконсультироваться со своим врачом.

Если Вы забыли принять Проспан® шипучие таблетки от кашля:

Не принимайте в следующий раз двойную дозу препарата, прием препарата нужно продолжить в дозировке, соответствующей предписаниям врача или же указаниям, приведенным в листке-вкладыше.

4. Каковы возможные побочные действия?

Как и все лекарственные препараты, Проспан® шипучие таблетки от кашля могут также иметь побочные действия, но они не обязательно должны возникать у каждого пациента. При оценке побочных действий за основу берут следующие показатели частоты:

Очень часто:	больше чем 1 пациент из 10
Часто:	от 1 до 10 пациентов из 100
Иногда:	от 1 до 10 пациентов из 1000
Редко:	от 1 до 10 пациентов из 10 000
Очень редко:	меньше, чем 1 пациент из 10000

Неизвестно:

оценить частоту на основании имеющихся данных невозможно

Возможные побочные действия:

После приема лекарственных препаратов, содержащих плющ, могут проявиться аллергические реакции, например: удушье, отеки, покраснения кожи, зуд. Частота неизвестна.

У чувствительных лиц могут возникнуть жалобы, связанные с желудочно-кишечным трактом, например: тошнота, рвота, понос. Частота неизвестна.

Сообщение о побочных действиях

Если Вы заметите у себя побочные действия, обратитесь к своему врачу или же к провизору. Это касается также и тех побочных действий, которые не приведены в этом листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о побочных действиях непосредственно в Федеральный институт лекарств и медицинской продукции, в отдел фармаконадзора, адрес: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, веб-сайт: www.bfarm.de.

Сообщив о побочных действиях, Вы сможете поспособствовать тому, чтобы в распоряжении общественности стало больше информации о безопасности этого лекарственного средства.

5. Как хранить Проспан® шипучие таблетки от кашля?

Хранить лекарственные средства в месте, недоступном для детей!

Применение этого лекарственного средства по истечении срока годности, указанного на складной упаковке и на

блистерной упаковке строго запрещено! Дата истечения срока годности означает последний день указанного месяца.

6. Дополнительная информация

Что содержат Проспан® шипучие таблетки от кашля?

Действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща

1 шипучая таблетка содержит 65 мг сухого экстракта листьев плюща (5 - 7,5 : 1).

Экстрагент: этанол 30 % (м/м).

Прочие компоненты включают:

безводную лимонную кислоту (Европейская фармакопея), натрия гидрокарбонат, натрия карбонат, маннитол (ЕФ), симетикон, натрия сахарин 2 H₂O, натрия цикламат, натрия цитрат 2 H₂O, сорбитол (ЕФ), триглицериды со средней длиной цепи, макроглицеролгидроксистерат (ЕФ), ароматизатор.

1 шипучая таблетка содержит 382 мг углеводов (что соответствует 0,03 XE).

Как выглядят Проспан® шипучие таблетки от кашля и содержимое упаковки:

Проспан® шипучие таблетки от кашля можно приобрести в оригинальной упаковке, содержащей 20 шипучих таблеток (N 1).

Фармацевтическая компания и изготовитель:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden

Тел.: +49 6101 - 539 - 300

Факс: +49 6101 - 539 - 315

Интернет: <http://www.engelhard-am.de>

E-мэйл: info@engelhard-am.de

Этот листок-вкладыш был последний раз обновлен в октябрь 2018 г.

