



Kullanma talimatı: Kullanıcı için bilgiler

Prospan® öksürük efervesan tabletleri

Oral sıvı

Etkin madde: Kurutulmuş hedera helix folium ekstresi

Bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilaç reçetesiz temin edilebilir. En iyi tedavi sonucunu elde etmek için Prospan® öksürük efervesan tabletleri doğru şekilde uygulanmalıdır.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Belirtilerinizin kötüleşmesi veya 7 gün sonra bir iyileşme görülmesi halinde mutlaka bir doktora başvurmalısınız.
- Belirtilen yan etkilerden birinin sizi önemli derecede etkilemesi veya bu broşürde belirtilmeyen bir yan etki fark etmeniz durumunda lütfen en kısa sürede doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Kullanma talimatının içeriği:

- Prospan® öksürük efervesan tabletleri nedir ve ne için kullanılır?
- Prospan® öksürük efervesan tabletlerini kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?
- Prospan® öksürük efervesan tabletleri nasıl alınmalıdır?
- Olası yan etkiler nelerdir?
- Prospan® öksürük efervesan tabletleri nasıl saklanmalıdır?
- Diğer bilgiler

- Prospan® öksürük efervesan tabletleri nedir ve ne için kullanılır?

Prospan® öksürük efervesan tabletleri, solunum yollarının kataral hastalıkları için bitkisel bir ilaçtır.

Prospan® öksürük efervesan tabletleri, üretken öksürükte bir balgam söktürücü olarak kullanılır.

Not:

Şikayetlerin devam etmesi ya da nefes darlığı, ateş, cerahatli ya da kanlı balgam görülmesi durumunda derhal bir doktora danışılmalıdır.

- Prospan® öksürük efervesan tabletlerini kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Prospan® öksürük efervesan tabletleri,

şağıdaki durumlarda alınmaz

Etkin maddeye veya ilacın diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

Fruktoz intoleransı durumunda tedavi sadece doktora danışıldıktan sonra verilmelidir.

Prospan® öksürük efervesan tabletleri aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır:

Çocuklar:

Prospan® öksürük efervesan tabletleri 6 yaş altı çocuklar için öngörülmemiştir.

Prospan® öksürük efervesan tabletlerinin diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Şimdiye kadar hiçbir etki-leşim bilinmemektedir.

Reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da kısa bir süre önce kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Gebelik ve emzirme dönemi:

Yeterli incelemeler yapılmadığı için bu ilaç gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler:

Özel önlemler gerekli değildir.

Prospan® öksürük efervesan tabletlerin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Bir efervesan tablet 6,58 mmol (veya 151,33 mg) sodyum içerir. Düşük tuzlu bir diyeteye uymanız gerekiyorsa bunu hesaba katmalısınız. Aroma verici laktoz içerir. 1 efervesan tablet 29,7 mg laktoz içerir.

Şekere karşı toleranssızlık şikayetiniz olduğunu biliyorsanız lütfen Prospan® öksürük efervesan tabletleri almadan önce doktorunuza danışınız.

- Prospan® öksürük efervesan tabletleri nasıl alınmalıdır?

Prospan® öksürük efervesan tabletlerini her zaman bu kullanma talimatına göre alınız. Tam emin olmadığınızda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Doktor tarafından aksi belirtilmediği müddetçe normal doz:

Yaş	Tek doz	Günlük toplam doz
Yetişkinler ve 12 yaş ve üstü ergenler	Sabah: 1 efervesan tablet eşittir 65 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi Akşam: ½ efervesan tablet eşittir 32,5 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi	1 defa 1 ve 1 defa ½ efervesan tablet eşittir 97,5 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi
6-12 yaş arası çocuklar	½ efervesan tablet eşittir 32,5 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi	2 defa ½ efervesan tablet eşittir 65 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi

Uygulama şekli

Çözüldükten sonra oral kullanım için efervesan tabletler.

Efervesan tabletler bölünebilir.

Efervesan tabletler bir bardak su (yakl. 100-200 ml) çözünmüş olarak sabahları ve akşamları alınır. Çözünme için sıcak veya soğuk su kullanılabilir.

Uygulama süresi

Tedavinin süresi, klinik tablonun tipine ve şiddetine göre değişir; genellikle 1 hafta sürdürülmelidir. Şikayetleri 1 haftadan uzun sürmesi halinde tıbbi yardım alınmalıdır.

Prospan® öksürük efervesan tabletlerin etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna kanaat getirirseniz doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Prospan® öksürük efervesan tabletleri kullandıysanız:

Prospan® öksürük efervesan tabletleri günlük olarak dozaj talimatında belirtilen veya doktor tarafından reçete edilenden daha fazla alınmamalıdır. Aşırı miktarda (günlük dozun üç katından fazla) alındığında mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir. Bu durumda doktorunuza danışmalısınız.

Prospan® öksürük efervesan tabletlerini kullanmayı unuttursanız:

Bir sonraki seferde çift doz almayınız, doktor tarafından reçete edildiği veya kullanma talimatında tarif edildiği şekilde kullanmaya devam edin.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Prospan® öksürük efervesan tabletlerin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin değerlendirilmesinde şu yaygınlık bilgileri temel alınmaktadır:

Çok yaygın:	10 kişiden 1'ini etkileyebilen
Yaygın:	100 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Yaygın olmayan:	1.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Seyrek:	10.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Çok seyrek:	10.000 kişiden 1'inden azını etkileyebilen
Bilinmiyor:	Mevcut verilerle yaygınlığı tahmin edilemiyor

Bilinmiyor:

Mevcut verilerle yaygınlığı tahmin edilemiyor

Olası yan etkiler:

Sarmaşık içeren ilaçlar alındıktan sonra, nefes darlığı, şişme, Sarmaşık içeren ilaçlar alındıktan sonra, nefes darlığı, şişme, kızarıklık, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Yaygınlığı bilinmemektedir.

Hassas kişilerde mide bulantısı, kusma, ishal gibi mide bağırsak şikayetleri görülebilir. Yaygınlığı bilinmemektedir.

Yan etkilerin bildirilmesi

Eğer yan etkiler fark ederseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu husus, bu prospektüste belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir.

Yan etkileri doğrudan Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn adresinde bulunan Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü), Pharmakovigilanz (farmakovijilans) bölümüne de bildirebilirsiniz, web sitesi: www.bfarm.de.

Yan etkileri bildirerek bu ilacın güvenliğiyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesine katkı sağlamış olursunuz.

5. Prospan® öksürük efervesan tabletleri nasıl saklanmalıdır?

İlacı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız!

İlacı kutusu ve folyo şeridi üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmamalısınız! Son kullanma tarihi ayın son gününe denk gelir.

6. Diğer bilgiler

Prospan® öksürük efervesan tabletleri neler içerir?

Etkin maddesi: Kurutulmuş heder helix folium ekstresi

1 efervesan tablet 65 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi içerir (5 - 7,5 : 1).

Özütleyici: Etanol %30 (m/m).

Yardımcı maddeler şunlardır:

Susuz sitrik asit (Ph.Eur.), sodyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat, mannitol (Ph.Eur.), simetikon, sakkarin sodyum 2 H₂O, sodyum siklamat, sodyum sitrat 2 H₂O, sorbitol (Ph.Eur.), orta zin-

cirli trigliseritler, makrogolgliserolhidroksistearat (Ph.Eur.), aroma verici. 1 efervesan tablet 382 mg karbonhidrat içerir (eşittir 0,03 BE).

Prospan® öksürük efervesan tabletlerin görünümü ve paket içeriği:

Prospan® öksürük efervesan tabletleri, 20 efervesan tablet içeren orijinal paketlerde mevcuttur.

Ruhsat sahibi ve üretici:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden

Tel.: 06101 / 539 – 300

Faks: 06101 / 539 – 315

İnternet: <http://www.engelhard-am.de>

E-posta: info@engelhard-am.de

Bu kullanma talimatı Ekim 2018 tarihinde onaylanmıştır.

