



Kullanma talimatı: Kullanıcı için bilgiler

Prospan® öksürük şurubu

Oral sıvı

Etkin madde: Kurutulmuş hedera helix folium ekstresi

Bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilaç reçetesiz temin edilebilir. En iyi tedavi sonucunu elde etmek için Prospan® öksürük şurubu doğru şekilde uygulanmalıdır.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Belirtilerinizin kötüleşmesi veya 7 gün sonra bir iyileşme görülmesi halinde mutlaka bir doktora başvurmalısınız.
- Belirtilen yan etkilerden birinin sizi önemli derecede etkilemesi veya bu broşürde belirtilmeyen bir yan etki fark etmeniz durumunda lütfen en kısa sürede doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Kullanma talimatının içeriği:

- Prospan® öksürük şurubu nedir ve ne için kullanılır?
- Prospan® öksürük şurubunu kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?
- Prospan® öksürük şurubu nasıl alınır?
- Olası yan etkiler nelerdir?
- Öksürük şurubu nasıl saklanmalıdır?
- Diğer bilgiler

1. Prospan® öksürük sıvısı nedir ve ne için kullanılır?

Prospan® öksürük şurubu, solunum yollarının kataral hastalıkları için bitkisel bir ilaçtır.

Prospan® öksürük şurubu, öksürüğün eşlik ettiği akut solunum yolu enflamasyonu ve kronik enflamatuvar bronşiyal hastalıkların semptomatik tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

Not:

Şikayetlerin devam etmesi ya da nefes darlığı, ateş, cerahatli ya da kanlı balgam görülmesi durumunda derhal bir doktora danışılmalıdır.

2. Prospan® öksürük sıvısını kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Prospan® öksürük şurubu, etkin maddeye veya ilacın diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz alınmamalıdır.

Prospan® öksürük şurubu aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır

Çocuklar:

Prospan® öksürük şurubu bir yaşın altındaki çocuklarda sadece doktora danışılarak kullanılmalıdır. Bu yaş grubundaki kullanım sadece yakın gözlem altında yapılmalıdır, çünkü bir yaşın altınd-

aki çocuklar büyük çocuklarla karşılaştırıldığında diyare ve kusma oluşumuna özellikle dikkat etmelidir. Lütfen yan etkilerde verilen bilgileri dikkate alınız.

Prospan® öksürük şurubunun diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Şimdiye kadar hiçbir etki-leşim bilinmemektedir. Reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da kısa bir süre önce kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Gebelik ve emzirme dönemi:

Yeterli incelemeler yapılmadığı için bu ilaç gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler:

Özel önlemler gerekli değildir.

Prospan® öksürük damlasının içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Bu ilaç sorbitol içerir. Her kullanımda 1,9 g'ya varan sorbitol alınır. Belli şekere karşı toleranssızlık şikayetiniz olduğunu biliyorsanız lütfen Prospan® öksürük şurubunu almadan önce doktorunuza danışınız.

3. Prospan® öksürük sıvısı nasıl alınır?

Prospan® öksürük şurubunu her zaman bu kullanma talimatına göre alınız. Tam emin olmadığınızda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Doktor tarafından aksi belirtilmediği müddetçe normal doz:

Yaş	Tek doz	Günlük toplam doz
6 yaş altı çocuklar	2,5 ml eşittir 17,5 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi	5 ml (2 defa 2,5 ml) eşittir 35 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi
6-12 yaş arası çocuklar	5 ml eşittir 35 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi	10 ml (2 defa 5 ml) eşittir 70 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi
12 yaş üstü çocuklar ve yetişkinler	5 ml eşittir 35 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi	15 ml (3 defa 5 ml) eşittir 105 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi

Uygulama şekli

Birlikte verilen işaretli ölçü kabıyla alınır. Sabah, (öğle) ve akşam alınır. Her kullanımdan önce iyice çalkalayınız!

Uygulama süresi

Tedavinin süresi, klinik tablonun tipine ve şiddetine göre değişir; genellikle 1 hafta sürdürülmelidir. Şikayetleri 1 haftadan uzun sürmesi halinde tıbbi yardım alınmalıdır.

Prospan® öksürük şurubunun etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna kanaat getirirseniz doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Prospan® öksürük şurubu kullandıysanız:

Prospan® öksürük şurubu günlük olarak dozaj talimatında belirtilen veya doktor tarafından reçete edilenden daha fazla alınmamalıdır. Aşırı miktarda (günlük dozun üç katından fazla) alındığında mide

bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir. Bu durumda doktorunuza danışmalısınız.

Prospan® öksürük şurubunu kullanmayı unutursanız:

Bir sonraki seferde çift doz almayınız, doktor tarafından reçete edildiği veya kullanma talimatında tarif edildiği şekilde kullanmaya devam edin.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Prospan® öksürük şurubunun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkilerin değerlendirilmesinde şu yaygınlık bilgileri temel alınmaktadır:

Çok yaygın:	10 kişiden 1'ini etkileyebilen
Yaygın:	100 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Yaygın olmayan:	1.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Seyrek:	10.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Çok seyrek:	10.000 kişiden 1'inden azını etkileyebilen
Bilinmiyor:	Mevcut verilerle yaygınlığı tahmin edilemiyor

Olası yan etkiler:

Sarmaşık içeren ilaçlar alındıktan sonra, nefes darlığı, şişme, kızarıklık, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Yaygınlığı bilinmemektedir. Hassas kişilerde mide bulantısı, kusma, ishal gibi mide bağırsak şikayetleri ve sorbitol içeriğinin müshil etkisi görülebilir. Yaygınlığı bilinmemektedir.

Yan etkilerin bildirilmesi

Eğer yan etkiler fark ederseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu husus, bu prospektüste belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Yan etkileri doğrudan Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn adresinde bulunan Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü), Pharmakovigilanz (farmakovijilans) bölümüne de bildirebilirsiniz, web sitesi: www.bfarm.de.

Yan etkileri bildirerek bu ilacın güvenliğiyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesine katkı sağlamış olursunuz.

5. Prospan® öksürük sıvısı nasıl saklanır?

İlacı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız!

İlacı kutusu ve kabının (etiket) üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmamalısınız! Son kullanma tarihi ayın son gününe denk gelir.

Açıldıktan veya hazırlandıktan sonra kullanım ömrü:

Açıldıktan sonra 6 ay içinde tüketilmelidir.

6. Diğer bilgiler

Prospan® öksürük şurubu neler içerir?

Etkin maddesi: Kurutulmuş hedera helix folium ekstresi

100 ml sıvı 0,7 g kurutulmuş hedera helix folium ekstresi içerir (5 - 7,5 : 1). Özütleyici: Etanol %30 (m/m).

Yardımcı maddeler şunlardır:

Potasyum sorbat (Ph.Eur.) (koruyucu), susuz sitrik asit (Ph.Eur.), ksantan sakızı, aroma verici, sorbitol çözeltisi %70 (kristalize) (Ph. Eur.), arıtılmış su.

2,5 ml sıvı 0,963 g tatlandırıcı sorbitol (Ph.Eur.) içerir = 0,08 BE.

Prospan® öksürük şurubunun görünümü ve paket içeriği:

Prospan® öksürük şurubu orijinal ambalajlarında 100 ml (N 1) ve 200 ml (N 2) sıvı olarak temin edilebilir.

1000 ml sıvı ile klinik paketi (5 x 200 ml).

Ruhsat sahibi ve üretici:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden
Tel.: 06101 / 539 – 300
Faks: 06101 / 539 – 315
İnternet: <http://www.engelhard-am.de>
E-posta: info@engelhard-am.de

Bu kullanma talimatı Ekim 2018 tarihinde onaylanmıştır.

Notlar:

Prospan® öksürük şurubu bitkisel etkin madde içerir. Bu bitki özü nedeniyle Prospan® ile hafif bulantılık ve düşük tat değişikliği mey-dana gelebilir. Ancak bunun ürün kalitesi üzerinde etkisi yoktur.

