

PROSPAN®



Öksürük pastilleri

Kullanma talimatı: Kullanıcı için bilgiler

Prosparan® öksürük pastilleri

Etkin madde: Kurutulmuş heder helix folium ekstresi

Bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilaç reçetesiz temin edilebilir. En iyi tedavi sonucunu elde etmek için Prosparan® öksürük pastilleri doğru şekilde uygulanmalıdır.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Daha fazla bilgi veya tavsiyeye gereksinim duymanız halinde eczacınıza başvurunuz.
- Belirtilerinizin kötüleşmesi veya 7 gün sonra bir iyileşme görülmemesi halinde mutlaka bir doktora başvurmalsınız.
- Belirtilen yan etkilerden birinin sizi önemli derecede etkilemesi veya bu broşürde belirtilmeyen bir yan etki fark etmeniz durumunda lütfen en kısa sürede doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Kullanma talimatının içeriği:

1. Prosparan® öksürük pastilleri nedir ve ne için kullanılır?
2. Prosparan® öksürük pastillerini kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?
3. Prosparan® öksürük pastilleri nasıl alınır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Prosparan® öksürük pastilleri nasıl saklanmalıdır?
6. Diğer bilgiler

1. Prosparan® öksürük pastilleri nedir ve ne için kullanılır?

Prosparan® öksürük pastilleri, solunum yollarının kataral hastalıkları için bitkisel bir ilaçtır.

Prosparan® öksürük pastilleri öksürüğün eşlik ettiği akut solunum yolu enflamasyonu ve kronik enflamatuvar bronşiyal hastalıkların semptomatik tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

Yetişkinlerde, gençlerde ve 6 yaş üzeri çocuklarda kullanılır.

2. Prosparan® öksürük pastillerini kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Prosparan® öksürük pastilleri aşağıdaki durumlarda alınmaz

- Etkin maddeye veya ilacın Bölüm 6 altında anılan diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

Uyarılar ve önlemler

Lütfen Prosparan® öksürük pastillerini kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Ateş, nefes darlığı, cerahatli veya kanlı balgam ve bir haftadan uzun süren ya da belirsiz olan şikayetlerde bir doktora başvurulmalıdır.

Çocuklar:

Prosparan® öksürük pastilleri 6 yaş altı çocuklar için öngörülmemiştir.

Prosparan® öksürük pastillerinin diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Şimdiye kadar hiçbir etkileşim bilinmemektedir.

Reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da kısa bir süre önce kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Gebelik ve emzirme dönemi:

Gebeyseniz ya da emziriyorsanız veya gebe olduğunuzdan şüpheleniyorsanız ya da hamile kalmak istiyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Yeterli incelemeler yapılmadığı için bu ilaç gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler:

Özel önlemler gerekli değildir.

Prosparan® öksürük pastillerinin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Bu ilaç sorbitol ve maltitol içerir. Belli şekere karşı toleranssızlık şikayetiniz olduğunu biliyorsanız lütfen Prosparan® öksürük pastillerini almadan önce doktorunuza danışınız.

3. Prosparan® öksürük pastilleri nasıl alınır?

Prosparan® öksürük pastillerini her zaman bu kullanma talimatına göre alınız. Tam emin olmadığınızda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından aksi belirtilmediği müddetçe normal doz: Yetişkinler ve 12 yaş ve üstü çocuklarda ihtiyaca göre günde en fazla 4 defa 1 pastil (günde 104 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi veya 624 mg ilaca eşittir).

6-12 yaş arası çocuklarda ihtiyaca göre günde en fazla 2 defa 1 pastil (günde 52 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi veya 312 mg ilaca eşittir).

Karaciğer ve/veya böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda somut dozaj önerileri için yeterli veri yoktur.

Uygulama şekli

Emme yoluyla oral kullanım içindir.

Pastilleri her öğünden sonra (yatarak değil) ağzınızda emerek eritin.

Uygulama süresi

Tedavinin süresi klinik tablonun tipine ve şiddetine göre değişir; genellikle 1 hafta sürdürülmelidir. Şikayetlerin 1 haftadan uzun sürmesi halinde tıbbi yardım alınmalıdır.

Prosparan® öksürük pastillerinin etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna kanaat getirirseniz doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Prosparan® öksürük pastilleri kullandıysanız:

Prosparan® öksürük pastilleri günlük olarak dozaj talimatında belirtilen veya doktor tarafından reçete edilenden daha fazla alınmamalıdır. Aşırı miktarda (günlük dozun üç katından fazla) kullanıldığında mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir. Bu durumda doktorunuza danışmalısınız.

Prosparan® öksürük pastillerini kullanmayı unutursanız:

Bir sonraki seferde çift doz almayınız, doktor tarafından reçete edildiği veya kullanma talimatında tarif edildiği şekilde kullanmaya devam ediniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Prospan® öksürük pastillerinin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin değerlendirilmesinde şu yaygınlık bilgileri temel alınmaktadır:

Çok yaygın:	10 kişiden 1'ini etkileyebilen
Yaygın:	100 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Yaygın olmayan:	1.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Seyrek:	10.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Çok seyrek:	10.000 kişiden 1'inden azını etkileyebilen
Bilinmiyor:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Olası yan etkiler:

Sarmaşık içeren ilaçlar alındıktan sonra nefes darlığı, şişme, cilt ve mukoza kızarıklıkları, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Yaygınlığı bilinmemektedir. Hassas kişilerde mide bulantısı, kusma, ishal gibi mide bağırsak şikayetleri görülebilir. Yaygınlığı bilinmemektedir.

Aşırı duyarlılık reaksiyonunun ilk belirtisinde Prospan® öksürük pastilleri tekrar alınmamalıdır.

Yan etkilerin bildirilmesi

Herhangi bir yan etki fark ederseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu husus, bu prospektüste belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir.

Yan etkileri doğrudan Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn adresinde bulunan Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal ilaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü), Pharmakovigilanz (farmakovijilans) bölümüne de bildirebilirsiniz, web sitesi: www.bfarm.de.

Yan etkileri bildirerek bu ilacın güvenliğiyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesine katkı sağlamış olursunuz.

5. Prospan® öksürük pastilleri nasıl saklanmalıdır?

🔑 İlacı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız!
25°C üzerinde sıcaklıkta saklamayınız.
İçeriği neme karşı korumak için orijinal ambalajı içerisinde muhafaza ediniz!

İlacı kutusu ve blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmamalısınız! Son kullanma tarihi ayın son gününe denk gelir.

6. Diğer bilgiler

Prospan® öksürük pastilleri neler içerir?

Etkin maddesi: Kurutulmuş heder helix folium ekstresi
1 pastil 26 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi içerir (5 - 7,5 : 1). Özütleme: Etanol %30 (m/m).

Yardımcı maddeler şunlardır:

Maltitol çözeltisi, sorbitol çözeltisi %70 (kristalize değil) (Ph. Eur.), Arap sakızı, sitrik asit, asesülfam potasyum, orta zincirli trigliseritler, portakal aroması, mentol aroması, arıtılmış su.

1 pastil 0,53 g maltitol ve 0,53 g sorbitol içerir, yakl. 0,09 BE değerine eşittir.

1 pastil 2,6 kcal içerir = 10,6 kJ.

Prospan® öksürük pastillerinin görünümü ve paket içeriği:

Prospan® öksürük pastilleri, 20 (N 1) pastil içeren orijinal paketlerde mevcuttur.

Ruhsat sahibi ve üretici

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG Herzbergstr. 3
61138 Niederdorfelden
Tel.: +49 6101 / 539 - 300
Faks: +49 6101 / 539 - 315
İnternet: <http://www.engelhard-am.de>
E-posta: info@engelhard-am.de

Bu kullanma talimatı Kasım 2020 tarihinde onaylanmıştır.

Notlar:

Prospan® öksürük pastilleri bitkisel etkin madde içerir. Bu bitki özü nedeniyle Prospan® öksürük pastilleri ile hafif bulanıklık ve düşük tat değişikliği meydana gelebilir. Ancak bunun ürün kalitesi üzerinde etkisi yoktur.

