

ПРОСПАН®

Капли от кашля

Листок-вкладыш информация для пользователей

Prospran® капли

Жидкость для приема внутрь

Действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща

Внимательно прочтите этот листок, так как в нем содержится важная для вас информация. Этот препарат продается без рецепта врача. Однако все же следует использовать капли Проспан® как описано в этом листке, чтобы получить наилучший возможный результат.

- Сохраните этот листок. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам потребуется дополнительная информация или совет — обратитесь к фармацевту.
- Если применение этого препарата в течение 7 дней ухудшит или не облегчит симптомы заболевания — обратитесь к врачу.
- Если любой из перечисленных ниже побочных эффектов станет тяжелым или вы обнаружите побочные эффекты, не упомянутые в этом листке, обратитесь к врачу или фармацевту.

Содержание листка-вкладыша

1. **Что такое капли Проспан® и для чего их применяют**
2. **О чем следует знать перед приемом капель Проспан®**
3. **Как следует принимать капли Проспан®**
4. **Возможные побочные эффекты**
5. **Как следует хранить капли Проспан®**
6. **Содержимое упаковки и прочие сведения**

1. Что такое капли Проспан® и для чего их применяют

Капли Проспан® являются лекарственным препаратом растительного происхождения для лечения заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся воспалением слизистой оболочки.

Капли Проспан® применяют для облегчения симптомов хронических воспалительных заболеваний бронхов, а также острого воспаления дыхательных путей, сопровождающегося кашлем.

Примечание.

Следует немедленно обратиться за медицинской помощью при наличии длительно не проходящих симптомов, а также при возникновении одышки, повышения температуры или выделения гнойной или кровавистой мокроты.

2. О чем следует знать перед приемом капель Проспан®

Не применяйте капли Проспан®:

- если у вас повышенная чувствительность (аллергия) на активное вещество или любой другой компонент этого препарата,
- если врач строго запретил вам прием минимальных количеств алкоголя (например, после программы реабилитации от алкогольной зависимости).

Капли Проспан® не следует принимать детям в возрасте до 1 года.

Требуется особая осторожность при приеме капель Проспан®:

Другие лекарства и капли Проспан®:

Исследования не проведены. В настоящее время взаимодействия неизвестны. Сообщите врачу или фармацевту, если вы в настоящее время принимаете (применяете) или недавно принимали (применяли) любые другие лекарства. В том числе сообщите о лекарствах, отпускаемых без рецепта.

Беременность и кормление грудью:

Поскольку не проведено исследований препарата при беременности и кормления грудью, применять этот препарат следует только после консультации с врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами:

Особые меры предосторожности не требуются.

Важная информация о некоторых компонентах капель Проспан®:

Этот препарат содержит спирт в концентрации 47 % по объему.

3. Как следует принимать капли Проспан®

Всегда принимайте капли Проспан® точно как описано в этом листке. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Если врач не назначит иные дозы, обычно принимают:

Возраст	Однократная доза	Суммарная суточная доза
Взрослые и дети в возрасте от 10 лет	24 капли, что соответствует 16,8 мг сухого экстракта листьев плюща	72 капли (3 x 24 капли), что соответствует 50,4 мг сухого экстракта листьев плюща
Дети (4-10 лет)	16 капли, что соответствует 11,2 мг сухого экстракта листьев плюща	48 капли (3 x 16 капли), что соответствует 33,6 мг сухого экстракта листьев плюща
Дети (1-4 лет)	12 капли, что соответствует 8,4 мг сухого экстракта листьев плюща	36 капли (3 x 12 капли), что соответствует 25,2 мг сухого экстракта листьев плюща

Способ применения:

Жидкость следует принимать до еды ежедневно утром, днем и вечером.

Продолжительность применения:

Продолжительность лечения зависит от характера и тяжести симптомов. Однако даже в случае слабого воспаления дыхательных путей капли следует принимать не менее 1 недели.

Чтобы обеспечить длительный успех лечения, мы также рекомендуем продолжать прием этого препарата еще 2-3 дня после устранения симптомов.

Если у вас возникнет впечатление, что капли Проспан® оказывают слишком сильный или слишком слабый эффект, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

Если вы приняли слишком много капель Проспан®:

Следует принимать в сутки не большее количество капель Проспан®, чем указано в инструкции по дозировке или назначено врачом. Прием гораздо больших количеств (более чем в три раза превосходящих суточную дозу) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В таком случае следует посоветоваться с врачом.

Если вы забыли принять капли Проспан®:

Не принимайте удвоенную дозу для возмещения пропущенных доз. Вместо этого продолжайте прием этого лекарства, как назначено врачом или указано в этом листке-вкладыше.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все другие лекарства, капли Проспан® могут вызвать побочные эффекты, однако они возникают не у всех пациентов. Для оценки побочных эффектов приняты следующие показатели частоты:

Очень частые: могут возникнуть у более чем 1 из 10 человек
Частые: могут возникнуть у 1-10 из 100 пациентов, получающих препарат
Нечастые: могут возникнуть у 1-10 из 1000 пациентов, получающих препарат
Редкие: могут возникнуть у 1-10 из 10000 пациентов, получающих препарат
Очень редкие: могут возникнуть у менее чем 1 из 10000 пациентов, получающих препарат
Неизвестно: частота не может быть определена по имеющимся данным

Возможные побочные эффекты:

В очень редких случаях прием лекарств, содержащих плющ, может вызвать аллергические реакции, например одышку, отеки, кожную сыпь и зуд. У чувствительных пациентов могут в очень редких случаях возникнуть симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, например тошнота, рвота и диарея.

Извещение о побочных эффектах

При возникновении любых побочных эффектов обратитесь к врачу или фармацевту. Это также относится к любым возможным побочным эффектам, не упомянутым в этом листке.

Сообщения о побочных эффектах также можно направить через Bundesinstitut für

Arzneimittel und Medizinprodukte [Федеральный институт лекарственных препаратов и медицинских устройств], Abt. Pharmakovigilanz [Отдел фармаконадзора] Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D53175 Bonn Website: www.bfarm.de.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете оказать помощь в получении новой информации о безопасности этого препарата.

5. Как следует хранить капли Проспан®

 **Храните этот препарат в месте, где он не виден и не доступен детям.**

Не используйте этот препарат после даты окончания срока годности, указанной на коробке и контурной ячейковой упаковке (этикетке). Датой окончания срока годности является последний день указанного месяца.

Информация о сроке хранения после первого вскрытия или приготовления:
6 месяцев

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Что содержат капли Проспан®

Активное вещество препарата: сухой экстракт листьев плюща

100 мл жидкости содержит 2 г сухого экстракта листьев плюща (5-7,5 : 1). Экстрагирующее вещество: Этанол 30 % по массе. 1 мл жидкости равноценен 29 каплям.

Другие компоненты:

сахарина натрия соль, анисовое масло, масло горького фенхеля, 96 % этанол, очищенная вода.

Внешний вид препарата капли Проспан® и содержимое упаковки

Капли Проспан® выпускаются в оригинальной упаковке с содержанием 20 мл (N1), 50 мл (N2) и 100 мл (N3) жидкости.

Не все размеры упаковок могут быть доступны на рынке.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden

Тел.: +49 6101 / 539 - 300

Факс: +49 6101 / 539 - 315

Веб-сайт: <http://www.engelhard-am.de>

Электронная почта: info@engelhard-am.de

Последняя редакция инструкции подготовлена в июле 2021 г.

Примечание.

Капли Проспан® содержат активное вещество растительного происхождения. Растительный экстракт может образовать темные частицы в жидкости. Также возможны небольшие изменения запаха препарата. Оба эти фактора не влияют на качество препарата.



ENGELHARD